FORSTBrandenburg
Landesbetrieb

Waldwerkstatt Dauerwald 2026

Aufbauend auf dem Eberswalder Waldkolloquium 2026

Der Dauerwald ist ein Prinzip und kein Rezept!

Im Eberswalder Waldkolloquium wurden Kernpunkte des Dauerwaldes identifiziert:


1. Stetigkeit des Waldwesens, speziell durch Verzicht auf Kahlschläge
2. Dauerwald ist kein Naturwald, er ist menschengemachter und bewirtschafteter Wald
3. Organisch-dynamische Betrachtung des Waldes
4. Einzelbaum- aber auch trupp- und gruppenweise Betrachtung, kleinflächig auftretende Waldentwicklungsphasen
5. Dauerhafte Fähigkeit des Waldes zur Selbstregeneration, Selbstregulierung und Kontinuität der Lebensäußerungen (Funktionen)

Dauerwald ist als Prinzip im Prinzip in der deutschen Waldbewirtschaftung angekommen?!


Diese und weitere Aspekte sollen die Grundlage für die heutige Waldwerkstatt bieten. Ziel ist es, die Ergebnisse der Diskussion in drei ausgewählten Beständen in einer abschließenden Synthese zusammenzufassen und die Bedeutung und Aktualität des Dauerwaldes als Zukunftsmodell in der heutigen Waldbewirtschaftung im Land Brandenburg zu erörtern.

Fragen zur Analyse und Diskussion:

1. Entspricht das Bestandsbild den Dauerwaldprinzipien?
2. Wie sieht das langfristige Ziel für diesen Ausgangsbestand aus?
3. Wie würde ihr nächster Eingriff konkret aussehen?
4. Wie lassen sich Struktur und Verjüngung dauerhaft auf der Fläche erhalten und entwickeln?
5. Ist das waldbauliche Vorgehen auf weitere Bestände in Brandenburg übertragbar?
6. Sind die zur Verfügung stehenden Bestandesdaten (FBMS) für waldbauliches Handeln auf der Fläche im Vergleich zu Stichprobendaten ausreichend?


Start LFE
Flaeche 1
Flaeche 2
Flaeche 3
Eberswalde
Westend
Brandenburgisches Viertel
Solarpark Finowtower 1
Verkehrslandeplatz Eberswalde-Finow
Schwärzesee
Specht hausen
Melchow
Schönholz
Normenfließ-Schwarzetal
Trampe
L 293
L 200
B 168
K 6007

Fläche 1: Abt. 1208 c[1]



Standortsinformationen

Mitteltemp.: 10,1 °C (+ 2 °C seit 1900), Jahresnied.: 500–600 mm

Finowtaler Sandbraunerde, Nährkraftstufe M5

Schöneberger Sandrostpodsol, Nährkraftstufe Z3

Schwärzer Sand-Ranker, Nährkraftstufe Z3

Probekreise: 10 m Radius, 7 cm Kluppschwelle

Probekreisdaten

PK	MH [m]	MD [cm]	Gha [m²/ha]	Vha [m³/ha]	N/ha
1	15,5	18,8	22,3	213,1	668,5
2	17,6	21,9	23,2	247,1	509,3
3	16,2	20,0	35,7	372,8	891,3
4	15,0	18,6	27,5	279,5	763,9
5	14,4	16,9	24,4	238,7	795,8
Mittel	15,8	19,3	26,6	270,2	725,7

Probekreisdaten nach Baumarten


Baumart	MH [m]	MD [cm]	Gha [m²/ha]	Vha [m³/ha]	Nha
EI	14,5	23,1	0,6	5,4	12,7
GBI	13,5	17,3	2,0	15,2	76,4
GKI	16,5	20,2	23,3	245,1	566,6
REI	14,2	18,9	0,3	2,5	12,7
RO	10,7	9,3	0,4	2,2	57,3

Daten Revierbuch FBMS Stand 06/2026

Schicht	Baumart	Fläche [ha]	Alt	MH [m]	MD [cm]	Gha [m²/ha]	Vha [m³/ha]
OB -1	GKI	2,8	68	17,3	20	22,00	176,00
	GBI	0,23	68	16,5	17	1,00	6,00
ÜH - 2	GKI	3,03	150	19,3	39	3,00	30,00
						26,00	212,00

Letzter Eingriff 2019 mit 49 Efm GKI und 2 Efm GBI

Fläche 2: Abt. 121 a²



Standortsinformationen:

Mitteltemp.: 10,1 °C (+ 2 °C seit 1900), Jahresnied.: 500–600 mm

Melchower Bändersand-Braunerde, Nährkraftstufe M3

Finowtaler Sandbraunerde, Nährkraftstufe M5

Probekreise:10 m Radius, 7 cm Kluppschwelle

Probekreisdaten

PK	MH [m]	MD [cm]	Gha [m²/ha]	Vha [m³/ha]	N/ha
1	18,7	20,9	27,4	310,8	573,0
2	24,1	35,4	46,9	638,1	382,0
3	15,4	14,1	14,9	156,4	700,3
4	20,5	24,9	20,8	251,6	350,1
5	19,7	28,0	35,1	510,6	350,1
6	17,6	19,2	22,6	266,9	541,1
Mittel	19,3	23,7	27,9	355,7	482,8


Probekreisdaten nach Baumarten

Baumart	MH [m]	MD [cm]	Gha [m²/ha]	Vha [m³/ha]	Nha
EI	26,2	42,5	4,6	60,7	31,8
GFI	18,1	22,8	4,5	55,6	89,1
GKI	29,1	44,7	3,1	43,6	19,1
RBU	18,1	19,7	21,3	265,1	426,5
RLB	11,2	16,5	0,3	1,8	12,7

Daten Revierbuch FBMS Stand 06/2026

Schicht	Baumart	Fläche [ha]	Alt	MH [m]	MD [cm]	Gha [m²/ha]	Vha [m³/ha]
OB -3	RBU	6,6	59	15,4	16	12,00	81,00
UN - 4	RBU	2,1	16	2,8	1	6,00	5,00
ÜH - 1	RBU	3,18	150	28,4	65	6,00	90,00
	TEI	1,43	128	27,6	33	2,00	31,00
	GDG	0,89	81	31,8	54	2	32,00
AB - 5	GFI	0	128	29,7	43	0	0,00
						28,00	239,00

Fläche 3: Abt. 105 a[1]/b[1]



Standortsinformationen:

Mitteltemp.: 10,1 °C (+ 2 °C seit 1900), Jahresnied.: 500–600 mm

Sonnenburger Bändersand-Braunerde Nährkraftstufe K4

Finowtaler Sandbraunerde, Nährkraftstufe M5, Lehmunterlagert, teils grundfeucht

Probekreise:10 m Radius, 7 cm Kluppschwelle

Probekreisdaten

PK	MH [m]	MD [cm]	Gha [m²/ha]	Vha [m³/ha]	N/ha
1	17,4	22,0	17,4	248,5	254,6
2	18,2	19,8	23,5	323,6	477,5
3	15,4	19,8	14,7	184,0	318,3
4	25,4	40,7	30,7	501,1	191,0
5	19,6	24,0	26,0	394,0	382,0
6	21,4	28,3	43,5	740,5	445,6
Mittel	19,6	25,8	26,0	398,6	344,8

Probekreisdaten nach Baumarten

Baumart	MH [m]	MD [cm]	Gha [m²/ha]	Vha [m³/ha]	Nha
GDG	24,9	40,1	6,9	128,5	38,2
GFI	23,8	34,4	2,2	35,1	19,1
GKI	11,0	16,3	1,2	11,4	31,8
HBU	14,1	12,1	0,3	1,6	19,1
RBU	19,4	23,7	20,3	298,1	299,2
RO	24,2	24,5	0,3	3,6	6,4

Daten Revierbuch FBMS Stand 06/2026, Fläche a[1]

Schicht	Baumart	Fläche [ha]	Alt	MH [m]	MD [cm]	Gha [m²/ha]	Vha [m³/ha]
OB - 1	RBU	4,52	127	26,9	49	11,00	158,00
	RBU	0,45	217	29,2	73	1,00	18,00
UN - 2	RBU	1,55	44	18,5	17	7,00	58,00
	RBU	1,2	0,31	7,5	6	4,00	11,00
	TEI	0,9	31	10,1	7	3,00	14,00
	GDG	0,54	25	10,8	9	3,00	12,00
	GKI	0,44	23	11,8	9	3,00	12,00
	GBI	0,18	29	17,3	13	1,00	4,00
	ELA	0,16	28	17	16	1,00	7,00
						34,00	294,00

letzte Eingriffe 2015 in Buche mit 81 Efm, 2019 in DGD und GKI mit 20 Efm, 2020 in TEI mit 11 Efm

Daten Revierbuch FBMS Stand 06/2026, Fläche b[1]

Schicht	Baumart	Fläche [ha]	Alt	MH [m]	MD [cm]	Gha [m²/ha]	Vha [m³/ha]
OB - 1	RBU	0,11	122	27,8	43	18,00	248,00
	RBU	0,01	207	29,7	72	2,00	30,00
UN - 3	RBU	0,01	39	15,2	21	12,00	86,00
UN - 4	GKI	0,12	25	9,5	9	7,00	30,00
ZW - 2	RBU	0,01	82	19,4	24	11,00	106,00
						50,00	500,00
OB - 1	GFI	9,69	65	28,1	27	45,00	626,00
						45,00	626,00

letzte Eingriffe RBU 2019 mit 282 Efm im OS und 2022 mit 11 Efm im ZW