



Die Spätblühende Trauben-Kirsche

Waldwerkstatt des Landeskompetenzzentrums Forst Eberswalde und der Landeswald-Oberförsterei Chorin

September 2023







Ablauf



- (1) Begrüßung
- (2) Impulsvortrag: "Die Spätblühende Trauben-Kirsche Ökologie und Management"
- (3) Einführung in das Exkursionsgebiet
- (4) Organisatorisches und Inhaltliches zum Ablauf im Walde

Abfahrt

- (5) Stationen 1-3 Diskussion mit Leitfragen & Protokollierung
- (6) Auswertung in der Gesamtgruppe



Landesbetrieb Forst Brandenburg Landeskompetenzzentrum Forst Eberswalde





Die Spätblühende Trauben-Kirsche

Waldwerkstatt des Landeskompetenzzentrums Forst Eberswalde und der Landeswald-Oberförsterei Chorin


Einführung in das Exkursionsgebiet





Regionale Einordnung





Landeswald-Oberförsterei Chorin mit 14 Revieren und 19.400 Hektar Landeswald

Reviere Melchow und Heegermühle

Wuchsbezirke Eberswalder Talabschnitt + Tramper Platte



Standorte



- Dominierend im Exkursionsgebiet: <u>mittlere und ziemlich arme</u>
 <u>Standorte der Finowtaler Talsandterrasse</u> (ca. 80 %)
- Böden mit <u>eiszeitlichem Ursprung</u>, z. T. nacheiszeitliche Dünenaufwehungen
- großflächige Ausdehnung von <u>Sandbraunerden</u>, Podsolen, Rostpodsolen und Sandrankern


Dominierende Waldgesellschaften im Gebiet wären nach HOFMANN der Schattenblumen-Buchenwald sowie Blaubeer-Kiefern-Traubeneichenwald oder Drahtschmielen-Eichenwald.



Standorte



Beispiel Exkursionspunkt 1 (Heegermühle, Abt. 142, TF b2):
 Schönebecker Sand-Rostpodsol, Schwärzer Sand-Ranker,
 Bodenseichener Sandbraunerde 5:3:2)






Klima



- DWD-Station Angermünde (1993-2022):
 Mittl. Lufttemperatur 9,47 °C, Jahresniederschlag 526 mm
- Level-II-Dauerbeobachtungsfläche Kienhorst: 8,67 °C / 585 mm



Übergangszone zu subkontinentalen Verhältnissen, Höhenlage ca. 40-70 m ü. NN)




Baumarten



Hauptbaumart: Gem. Kiefer, Unterstand: v. a. RBU, TEI

Bestandeszustands-Typen






Baumarten



Hauptbaumart: Gem. Kiefer, Unterstand: v. a. RBU, TEI

Baumartenverteilung ohne Kiefer (8502 ha / 158 ha)





Umgang mit der STK




- STK wird im Konfliktfall mit natürlicher Verjüngung von Zielbaumarten zurückgedrängt / aktiv behandelt
- Grundvoraussetzungen:
 - > Inventur
 - > intensive, erfolgreiche Bejagung gesichert
 - NV von Zielbaumarten vorhanden / zu erwarten
 - hinreichender Pflegezustand im Oberstand
 - langfristige Strategie für Entwicklung der Verjüngung



Umgang mit der STK



• Inventur der Reviere (orange: ≤ 50 %, rot: > 50 % Deckung)





... WaldWERKSTATT



